

⚠ 使用上の注意

■してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人。(3)15才未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。(3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください

4. 連続して2週間以上使用しないでください

(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けてください)

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3)妊婦又は妊娠していると思われる人。(4)高齢者。(5)次の診断を受けた人。気管支ぜんそく

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざができる、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢・軟便

4. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(他の疾患の可能性あります)

効 能

肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

プラスチックフィルムをはがし、1日1回患部に貼ってください。

[注意] (1)定められた用法・用量を厳守してください。(2)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。(3)1日あたり4枚を超えて使用しないでください。(4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。(5)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

成 分

成分	分量	はたらき	
膏体 100g中	ロキソプロフェン ナトリウム水和物	5.67g (無水物として5g)	痛みの原因物質(プロスタグランジン)の生成をおさえ、痛みをやわらげます。
	l-メントール	1.6g	清涼感をあたえ、痛みをやわらげます。
	トコフェロール酢酸エステル	2.3g	患部の血行を促進します。

添加物: スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、ポリイソブチレン、脂環族飽和炭化水素樹脂、ジブチルヒドロキシトルエン、流動パラフィン、その他3成分

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)開封後は未使用分はもとの袋に入れ、袋の開口部をきちんと折り曲げて保管してください。(品質保持のため) (4)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります) (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべくはやく使用してください。

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931



使用期限(西暦年)

製造番号